Educational Patient Card
PrM-TERIFLUNOMIDE

MANTRA PHARMA

Have this card with you at all times. Show it to any healthcare professional who sees you and when you go to the hospital.

My Contact Information

Name: _____

Date of Birth: _____ Gender: _____ Phone Number: _____

Emergency Contact Name: _____

Emergency Contact Phone Number: _____

My Presciber's Contact Information

Name of Prescriber of M-TERIFLUNOMIDE:

_____

Office Phone Number:

_____

After-Hours Phone Number:

_____

Pharmacy Phone Number:

_____

IMPORTANT INFORMATION FOR PATIENTS

Teriflunomide reduces the activity of the immune system (immunomodulator). In some people, teriflunomide can cause liver damage (hepatitis) and it may also reduce the production of white blood cells that fight infection (neutrophils) and platelets that are involved in blood clotting. Your liver function tests and blood pressure should be checked regularly during teriflunomide treatment and your full blood count should be checked if necessary. These tests should also be checked before starting treatment.

If you experience any of the following side effects, please contact your doctor immediately:

- Yellow skin or yellowing of the whites of your eyes (jaundice), unexplained nausea or vomiting, abdominal pain or darker urine than normal. These are the symptoms of a liver problem;
- Signs of an infection including fever, shivering, pain on passing urine or confusion.

Please ensure to read the Patient Medication Information along with the Patient Information Brochure before taking M-TERIFLUNOMIDE and each time you get a refill. These documents are also available on **www.groupemantra.ca/m-teriflunomide**/.

BIRTH CONTROL, PREGNANCY and RISK OF BIRTH DEFECTS

- Do not take M-TERIFLUNOMIDE if you are pregnant. Pregnancy must be avoided by using effective birth control while you are on M-TERIFLUNOMIDE.
- If you are a female of childbearing potential, pregnancy should be ruled out by a pregnancy test before you start taking M-TERIFLUNOMIDE.
- Tell your doctor immediately if you become pregnant, are late starting your period, or have any reason to suspect pregnancy while taking M-TERIFLUNOMIDE or within 2 years of stopping it.

If you become pregnant while taking M-TERIFLUNOMIDE or within 2 years after stopping the treatment, tell your healthcare professional immediately and enroll in the M-TERIFLUNOMIDE Pregnancy Active Surveillance Program at **1-833-651-1661**.

IMPORTANT CONTACT INFORMATION:

M-TERIFLUNOMIDE Pregnancy Active Surveillance Program:
by calling **1-833-651-1661**

Mantra Pharma Inc. Medical information:
by calling **1-833-248-7326**
by email at **medinfo@mantrapharma.ca**

Carte éducative Patient
PrM-TERIFLUNOMIDE

MANTRA PHARMA

Gardez cette carte sur vous en tout temps. Présentez-la à tout professionnel de la santé qui vous rencontre, et lorsque vous allez à l'hôpital.

Mes coordonnées

Nom : _____

Date de naissance : _____ Genre : _____ Tél. : _____

Personne à joindre en cas d'urgence : _____

Numéro de la personne à joindre en cas d'urgence : _____

Coordonnées de mon prescripteur

Nom du prescripteur ayant prescrit M-TERIFLUNOMIDE :

_____

Numéro de téléphone au bureau :

_____

Numéro de téléphone après les heures d'ouvertures :

_____

Numéro de téléphone de la pharmacie :

_____

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LES PATIENTS

Le tériflunomide réduit l'activité du système immunitaire (immunomodulateur). Chez certaines personnes, le tériflunomide peut causer des dommages au foie (hépatite) et il peut également réduire la production de globules blancs qui combattent les infections (neutrophiles) et de plaquettes qui participent à la coagulation du sang. Vos tests de la fonction hépatique et votre tension artérielle doivent être contrôlés régulièrement pendant le traitement par le tériflunomide et votre formule sanguine complète doit être vérifiée si nécessaire. Ces tests doivent également être vérifiés avant de commencer le traitement.

Si vous présentez un des effets indésirables suivants, veuillez contacter votre médecin immédiatement :

- une peau jaune ou un jaunissement du blanc des yeux (jaunisse), des nausées ou des vomissements inexpliqués, des douleurs abdominales ou une urine plus foncée que la normale. Ce sont les symptômes d'un problème de foie;
- des signes d'une infection, notamment la fièvre, des frissons, la douleur au moment d'uriner ou la confusion.

Assurez-vous de lire les Renseignements sur le médicament pour le patient ainsi que la Brochure d'information pour le patient avant de prendre M-TERIFLUNOMIDE et lors de chaque renouvellement de prescription. Ces documents sont également disponibles sur **www.groupemantra.ca/m-teriflunomide/.**

CONTRACEPTION, GROSSESSE et RISQUE D'ANOMALIES CONGÉNITALES

- Ne prenez pas M-TERIFLUNOMIDE si vous êtes enceinte. La grossesse doit être évitée en utilisant une méthode de contraception efficace pendant que vous prenez M-TERIFLUNOMIDE;
- Si vous êtes une femme en âge de procréer, la grossesse doit être exclue par un test de grossesse avant de commencer à prendre M-TERIFLUNOMIDE;
- Informez immédiatement votre médecin si vous devenez enceinte, si vos règles ont du retard ou si vous avez une raison de soupçonner une grossesse pendant que vous prenez M-TERIFLUNOMIDE ou dans les deux ans suivant son arrêt.

Si vous devenez enceinte pendant que vous prenez M-TERIFLUNOMIDE ou jusqu'à deux ans après avoir cessé le traitement, informez immédiatement votre professionnel de la santé et inscrivez-vous au Programme de Surveillance Active de la Grossesse pour M-TERIFLUNOMIDE au **1-833-651-1661**.

POINTS DE CONTACTS IMPORTANTS :

Programme de Surveillance Active de la Grossesse pour M-TERIFLUNOMIDE :
en composant le **1-833-651-1661**

Information Médicale Mantra Pharma Inc. :
en composant le **1-833-248-7326**
par courriel au **medinfo@mantrapharma.ca**